★ Weekly PAC＋HER(2回目以降:2mg/kg)7d:16030031　　2019年12月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・乳癌
プロトコール名	Weekly PAC＋HER(2回目以降:2mg/kg)7d
1コース日数	7日
催吐リスク分類	軽度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7
トラスツズマブ注	2mg/kg	●						
パクリタキセル注	80mg/㎡	●						

治療スケジュール

処方

レスタミン錠(10)　　5錠　1日1回　朝(day1)

※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する際は改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)
→
生食 250mL
トラスツズマブ注
2mg/kg
→ 30分※ → 500mL/h
レスタミン(10) 5錠
生食 100mL
デキサート注 6.6mg
ファモチジン注20mg
→ 30分 → 200mL/h
5%糖液 250mL
パクリタキセル注
80mg/㎡
→ 1時間 → 250mL/h
終了

フィルター付ルート使用

※2回目以降、30分に変更可能

福岡大学筑紫病院