★ GEM(D1, 8)＋HER(初回:8mg/kg)21d:16030033　　2019年12月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・乳癌
プロトコール名	GEM(D1, 8)＋HER(初回:8mg/kg)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	軽度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン注	1250mg/㎡	●							●													
トラスツズマブ注	8mg/kg	●																				

治療スケジュール

処方

※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する際は改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL

Day1

生食 100mL（ルート確保用） → 生食 250mL トラスツズマブ注 8mg/kg → 90分※ 167mL/h → 生食 100mL デキサート注 6.6mg → 30分 200mL/h → 5%糖液 100mL ゲムシタビン注 1250mg/㎡ → 30分 200mL/h → 終了

※2回目以降、30分に変更可能

Day8

5%糖液 100mL（ルート確保用） → 生食 100mL デキサート注 6.6mg → 30分 200mL/h → 5%糖液 100mL ゲムシタビン注 1250mg/㎡ → 30分 200mL/h → 終了

福岡大学筑紫病院