★ GEM(D1, 8)＋HER(2回目以降:6mg/kg)21d:16030034

2019年12月(第1版)

| | |
|---|---|
| **診療科・対象疾患** | 外科・乳癌 |
| **プロトコール名** | GEM(D1, 8)＋HER(2回目以降:6mg/kg)21d |
| **1コース日数** | 21日 |
| 催吐リスク分類 | 軽度 |

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲムシタビン注 | 1250mg/㎡ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トラスツズマブ注 | 6mg/kg | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**治療スケジュール**

処方

※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する際は改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL

**Day1**

生食 100mL（ルート確保用） → 生食 250mL トラスツズマブ注 6mg/kg → 30分※ 500mL/h → 生食 100mL デキサート注 6.6mg → 30分 200mL/h → 5%糖液 100mL ゲムシタビン注 1250mg/㎡ → 30分 200mL/h → 終了

※2回目以降、30分に変更可能

**Day8**

5%糖液 100mL（ルート確保用） → 生食 100mL デキサート注 6.6mg → 30分 200mL/h → 5%糖液 100mL ゲムシタビン注 1250mg/㎡ → 30分 200mL/h → 終了

福岡大学筑紫病院