★ TC(D1)＋HER(初回:8mg/kg)21d:16030045　　2020年6月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・乳癌
プロトコール名	TC(D1)＋HER((初回:8mg/kg)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
トラスツズマブ注	8mg/kg	●																											
ドセタキセル注	75mg/㎡	●																											
シクロホスファミド	600mg/㎡	●																											

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day2、3)
デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)
(制吐目的に必要時)デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day4)

※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する際は改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL
※ イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)
→
生食 250mL
トラスツズマブ注
8mg/kg
→ 90分※ 167mL/h
アロキシ点滴 0.75mg
デキサート注4.95mg
→ 15分 200mL/h
5%糖液 250mL
ドセタキセル注
75mg/㎡
→ 1時間 250mL/h
生食 250mL
エンドキサン注
600mg/㎡
→ 1時間 250mL/h
終了

閉鎖式ルート使用

※2回目以降、30分に変更可能

福岡大学筑紫病院