★ TC(D1)＋HER(2回目以降:6mg/kg)21d:16030046　　2020年6月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・乳癌
プロトコール名	TC(D1)＋HER(2回目以降:6mg/kg)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
トラスツズマブ注	6mg/kg	●																											
ドセタキセル注	75mg/㎡	●																											
シクロホスファミド	600mg/㎡	●																											

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day2、3)
デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)
(制吐目的に必要時)デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day4)

※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する際は改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL
※ イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

Day1

生食 100mL (ルート確保用) → 生食 250mL トラスツズマブ注 6mg/kg → 30分※ 500mL/h → アロキシ点滴 0.75mg デキサート注4.95mg → 15分 200mL/h → 5%糖液 250mL ドセタキセル注 75mg/㎡ → 1時間 250mL/h → 生食 250mL エンドキサン注 600mg/㎡ → 1時間 250mL/h → 終了

閉鎖式ルート使用

※2回目以降、30分に変更可能

福岡大学筑紫病院