★ IRIS＋P-mab(D1)14d:16040006

2018年5月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・大腸癌
プロトコール名	IRIS＋P-mab(D1)14d
1コース日数	14日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス注	6mg/kg	●													
イリノテカン注	80mg/㎡	●													
TS-1	下記参照	●	●	●	●	●	●	●							

治療スケジュール

処方

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

イメンドカプセル(125)　　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　　1C　1日1回　朝(day2、3)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)

TS-1投与量	下記投与量を1日2回		
体表面積	1.25㎡未満	1.25㎡以上1.5㎡未満	1.5㎡以上
1回投与量	40mg	50mg	60mg

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)

→

アロキシ点滴 0.75mg
デキサート注 4.95mg

15分 →
200mL/h

生食 50mL

15分 →
200mL/h

生食 100mL
ベクティビックス注
6mg/kg

60分 →
100mL/h

生食 50mL

15分 →
200mL/h

フィルター付ルート使用

5%糖液 250mL
イリノテカン注
80mg/㎡

2時間 →
125mL/h

終了

福岡大学筑紫病院