★ FOLFIRI(D1)14d:16040007

2018年5月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・大腸癌
プロトコール名	FOLFIRI(D1)14d
1コース日数	14日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イリノテカン注	150mg/㎡	●													
レボホリナート注	200mg/㎡	●													
5-FU注 急速静注	400mg/㎡	●													
5-FU注 持続点滴(46時間)	2400mg/㎡	●	→												

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day2、3)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)

→

アロキシ点滴 0.75mg
デキサート注 4.95mg

→ 15分

5%糖液 250mL
イリノテカン注
150mg/㎡

5%糖液 250mL
レボホリナート注
200mg/㎡

200mL/h

→ 2時間

125mL/h

生食 100mL
5-FU注
400mg/㎡

→ 全開

生食
5-FU注
2400mg/㎡

→ 46時間持続

2mL/h

→ 終了

福岡大学筑紫病院