★ XELOX(D1)21d:16040024

2018年5月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・大腸癌
プロトコール名	XELOX(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エルプラット注	130mg/㎡	●																				
ゼローダ錠	C法(下記参照)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

治療スケジュール

処方

レスタミン錠(10)　5錠　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day2、3)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

ゼローダ投与量	下記投与量を1日2回　朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

Day1

5%糖液 100mL
(ルート確保用)

→

レスタミン(10) 5錠

アロキシ点滴 0.75mg
デキサート注 4.95mg

→ 15分 → 200mL/h

5%糖液 250mL
エルプラット注
130mg/㎡
デキサート注 3.3mg

→ 2時間 → 125mL/h → 終了

5%糖液 500mL
250mL/h

福岡大学筑紫病院