★ XELOX＋P-mab(D1)14d：16040026

2018年5月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・大腸癌
プロトコール名	XELOX＋P-mab(D1)14d
1コース日数	14日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス注	6mg/kg	●													
エルプラット注	85mg/㎡	●													
ゼローダ錠	C法（下記参照）	●	●	●	●	●	●	●							

治療スケジュール

処方

レスタミン錠（10）　5錠　1日1回　朝（day1）
イメンドカプセル（125）　1C　1日1回　朝（day1）
イメンドカプセル（80）　1C　1日1回　朝（day2、3）
（必要時）デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝（day2、3）

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

ゼローダ投与量	下記投与量を1日2回　朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

Day1

5%糖液 100mL
（ルート確保用）
→
レスタミン（10）5錠
アロキシ点滴 0.75mg
デキサート注 4.95mg
→ 15分 → 200mL/h
生食 50mL
→ 15分 → 200mL/h
生食 100mL
ベクティビックス注 6mg/kg
→ 60分 → 100mL/h
生食 50mL
→ 15分 → 200mL/h

フィルター付ルート使用

5%糖液 250mL
エルプラット注 85mg/㎡
デキサート注 3.3mg
→ 2時間 → 125mL/h → 終了

5%糖液 500mL
250mL/h

福岡大学筑紫病院