★ mFOLFOX6＋P-mab(D1)14d:16040036

2018年5月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・大腸癌
プロトコール名	mFOLFOX6＋P-mab(D1)14d
1コース日数	14日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス注	6mg/kg	●													
エルプラット注	85mg/㎡	●													
レボホリナート注	200mg/㎡	●													
5-FU注 急速静注	400mg/㎡	●													
5-FU注 持続点滴(46時間)	2400mg/㎡	●	→												

治療スケジュール

処方

レスタミン錠 (10)　　5錠　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(125)　　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　　1C　1日1回　朝(day2、3)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)

※ イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)
→
レスタミン (10) 5錠
アロキシ点滴 0.75mg
デキサート注 4.95mg
→ 15分 → 200mL/h
生食 50mL
→ 15分 → 200mL/h
生食 100mL
ベクティビックス注
6mg/kg
→ 60分 → 100mL/h
生食 50mL
→ 15分 → 200mL/h

フィルター付ルート使用

5%糖液 250mL
エルプラット注
5%糖液 250mL
レボホリナート注
→ 2時間 → 125mL/h
生食 100mL
5-FU注
400mg/㎡
→ 全開
生食
5-FU注
2400mg/㎡
→ 46時間持続 → 2.5mL/h
終了

福岡大学筑紫病院