


|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 診療科・対象疾患 | 外科・大腸癌                |
| プロトコール名  | TAS-102+Bev(D1.15)28d |
| 1コース日数   | 28日                   |
| 催吐リスク分類  | 最小度                   |

| 薬剤名    | 投与量    | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|--------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| アバスチン注 | 5mg/kg | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ロンサーフ錠 | 下記参照   | ●    | ● | ● | ● | ● |   |   | ● | ● | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

治療スケジュール

処方

Day1、15



※2コース目60分、3コース目以降30分  
と段階的に変更可能

| 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 初回基準量<br>(トリフルリジン相当量) |
|-----------------------|-----------------------|
| 1.07未満                | 35mg/回(70mg/日)        |
| 1.07以上～1.23未満         | 40mg/回(80mg/日)        |
| 1.23以上～1.38未満         | 45mg/回(90mg/日)        |
| 1.38以上～1.53未満         | 50mg/回(100mg/日)       |
| 1.53以上～1.69未満         | 55mg/回(110mg/日)       |
| 1.69以上～1.84未満         | 60mg/回(120mg/日)       |
| 1.84以上～1.99未満         | 65mg/回(130mg/日)       |
| 1.99以上～2.15未満         | 70mg/回(140mg/日)       |
| 2.15以上                | 75mg/回(150mg/日)       |