★ FOLFIRI＋ザルトラップ (D1)14d：16040044　　2018年5月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・大腸癌
プロトコール名	FOLFIRI＋ザルトラップ (D1)14d
1コース日数	14日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ザルトラップ注	4mg/kg	●													
イリノテカン注	150mg/㎡	●													
レボホリナート注	200mg/㎡	●													
5-FU注 急速静注	400mg/㎡	●													
5-FU注 持続点滴(46時間)	2400mg/㎡	●	→												

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day2、3)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)

※ イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)
フィルター付ルート使用

→ アロキシ点滴 0.75mg
デキサート注 4.95mg

15分 →
200mL/h

生食 100mL
ザルトラップ注
4mg/kg

60分 →
100mL/h

5%糖液 250mL
イリノテカン注
150mg/㎡

5%糖液 250mL
レボホリナート注
200mg/㎡

2時間 →
125mL/h

生食 100mL
5-FU注
400mg/㎡

全開 →

生食
5-FU注
2400mg/㎡

46時間持続 →
2mL/h

終了

福岡大学筑紫病院