| | |
|---|---|
| **診療科・対象疾患** | 泌尿器科・腎細胞癌 |
| **プロトコール名** | キイトルーダ＋アキシチニブ（3週毎） |
| **1コース日数** | 21日 |
| 催吐リスク分類 | 最小度 |

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キイトルーダ注 | 200mg/body | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アキシチニブ | 1日2回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**治療スケジュール**

処方

※ アキシチニブ（インライタ®）は1回5mg1日2回、2週間連続投与し、忍容性が認められる場合には、1回7mg1日2回投与に増量することができる。連続2週間投与して忍容性が認められる場合に、更に最大1回10mg1日2回に増量することができる。

**Day1**

生食 100mL
（ルート確保用）

→

生食 100mL
キイトルーダ注
200mg/body

30分 →
200mL/h

終了

*フィルター付ルート使用*