★ PAC＋CBDCA＋Bev（3週毎）：13020008　　2019年7月（第1版）

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	PAC＋CBDCA＋Bev（3週毎）
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
アバスチン注	15mg/kg	●																											
パクリタキセル注	175mg/㎡	●																											
カルボプラチン注	AUC5～6	●																											

治療スケジュール

処方

レスタミン錠（10）　5錠　1日1回　朝（day1）
イメンドカプセル（125）　1C　1日1回　朝（day1）
イメンドカプセル（80）　1C　1日1回　朝（day2、3）
（必要時）デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝（day2、3、4）

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

Day1

生食 500mL
（ルート確保用）
→
生食 100mL
アバスチン注
15mg/kg
90分※
→
レスタミン（10）5錠
アロキシ点滴0.75mg
デキサート注16.5mg
ファモチジン注 20mg
15分
200mL/h
→
生食 500mL
パクリタキセル注
175mg/㎡
3時間
160mL/h
→
5%糖液 250mL
カルボプラチン注
AUC5～6
1時間
280mL/h
→
終了

※2コース目60分、3コース目以降30分
と段階的に変更可能

福岡大学筑紫病院