★ PEM＋CBDCA＋Bev(3週毎):13020018

2019年7月(第1版)

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	PEM＋CBDCA＋Bev(3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アバスチン注	15mg/kg	●																				
アリムタ注	500mg/㎡	●																				
カルボプラチン注	AUC5～6	●																				

治療スケジュール

処方

パンビタン末　1g　1日1回　朝食後
　初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
メチコバール注500μg　2A　筋注
　初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与
イメンドカプセル(125)　　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　　1C　1日1回　朝(day2、3)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3、4)

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

Day1

生食 500mL
(ルート確保用)
→
生食 100mL
アバスチン注
15mg/kg
→ 90分※
アロキシ点滴0.75mg
デキサート注4.95mg
→ 15分
200mL/h
生食 100mL
アリムタ注
500mg/㎡
→ 10分
600mL/h
生食 100mL
→ 30分
200mL/h

※2コース目60分、3コース目以降30分
と段階的に変更可能

5%糖液 250mL
カルボプラチン注
AUC5～6
→ 1時間
280mL/h
終了

福岡大学筑紫病院