★ PEM＋CBDCA（3週毎）:13020019

2019年7月（第1版）

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	PEM＋CBDCA（3週毎）
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
アリムタ注	500mg/㎡	●																											
カルボプラチン注	AUC5～6	●																											

治療スケジュール

処方

パンビタン末　1g　1日1回　朝食後
　初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
メチコバール注500μg　2A　筋注
　初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与
イメンドカプセル（125）　1C　1日1回　朝（day1）
イメンドカプセル（80）　1C　1日1回　朝（day2、3）
（必要時）デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝（day2、3、4）

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

Day1

生食 500mL
（ルート確保用）
→
アロキシ点滴0.75mg
デキサート注4.95mg
→ 15分 / 200mL/h
生食 100mL
アリムタ注
500mg/㎡
→ 10分 / 600mL/h
生食 100mL
→ 30分 / 200mL/h
5%糖液 250mL
カルボプラチン注
AUC5～6
→ 1時間 / 280mL/h
終了

福岡大学筑紫病院