

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	キイトルーダ+PEM+CDDP(3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
キイトルーダ注	200mg/body	●																															
アリムタ注	500mg/m ²	●																															
シスプラチン注	75mg/m ²	●																															


治療スケジュール

処方

パンビタン末 1g 1日1回 朝食後
 初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
メチコバル注500μg 2A 筋注
 初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与
イメンドカプセル(125) 1C 1日1回 朝(day1)
イメンドカプセル(80) 1C 1日1回 朝(day2、3)
デカドロン錠(4) 2錠 1日2回 朝昼(day2、3、4、必要時day5)

※イメンドカプセル125mg 1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前
 ※治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本
 飲水すること
 ※1日尿量が3000mL以上になるように調整
 ※当日は測尿を行う

Day 1



フィルター付ルート使用

