★ キイトルーダ＋PEM maintenance（3週毎）：13020049　　2019年7月（第1版）

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	キイトルーダ＋PEM maintenance（3週毎）
1コース日数	21日
催吐リスク分類	軽度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
キイトルーダ注	200mg/body	●																											
アリムタ注	500mg/㎡	●																											

治療スケジュール

処方

パンビタン末　1g　1日1回　朝食後
　初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
メチコバール注500μg　2A　筋注
　初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与

※ キイトルーダ＋PEM＋CDDP療法またはキイトルーダ＋PEM＋CBDCA療法
　4コース後の維持療法

Day 1

生食 500mL
（ルート確保用）
→
生食 100mL
キイトルーダ注
200mg/body
→ 30分 → 200mL/h
生食 50mL
→ 15分 → 200mL/h
生食100mL
デキサート注6.6mg
→ 30分 → 200mL/h
生食 100mL
アリムタ注
500mg/㎡
→ 10分 → 600mL/h
終了

フィルター付ルート使用

福岡大学筑紫病院