★ ポートラーザ＋GEM＋CDDP（3週毎）：13020056　　2020年3月（第1版）

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	ポートラーザ＋GEM＋CDDP（3週毎）
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ポートラーザ注	800mg/body	●							●																				
ゲムシタビン注	1250mg/㎡	●							●																				
シスプラチン注	75mg/㎡	●																											

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝（day1）
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝（day2、3）
デカドロン錠(4)　2錠　1日2回　朝昼（day2、3、4、必要時day5）

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前
※ポートラーザは調製後4時間以内に投与を開始する
※治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること
※1日尿量が3000mL以上になるように調整
※当日は測尿を行う

Day 1

生食 500mL（ルート確保用）
→ 生食 200mL ポートラーザ注 800mg/body
→ 1時間 250mL/h
→ 生食 50mL
→ 15分 200mL/h
→ 生食 500mL KCL注 10mEq 硫酸Mg補正液4mEq
→ 1時間 500mL/h
→ アロキシ点滴0.75mg デキサート注9.9mg
→ 15分 200mL/h

5%ブドウ糖 100mL ゲムシタビン注 1250mg/㎡
→ 30分 200mL/h
→ 生食 50mL
→ 15分 200mL/h
→ 20%マンニットール注 300mL
→ 45分 400mL/h
→ 生食 300mL シスプラチン注 75mg/㎡
→ 2時間 240mL/h
→ 生食 500mL KCL注 10mEq 硫酸Mg補正液4mEq
→ 1時間 500mL/h
→ 終了

Day 8

生食 500mL（ルート確保用）
→ 生食 200mL ポートラーザ注 800mg/body
→ 1時間 250mL/h
→ 生食 50mL
→ 15分 200mL/h
→ 5%ブドウ糖 100mL ゲムシタビン注 1250mg/㎡
→ 30分 200mL/h
→ 終了

福岡大学筑紫病院