★ SP(D8)35d:16070011

2018年5月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	SP(D8)35d
1コース日数	35日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	・	・	・	33	34	35
シスプラチン注	60mg/㎡								●																									
S-1	下記参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day8)
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day9、10)
デカドロン錠(4)　2錠　1日2回　朝昼(day9、10、11、必要時day12)

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

S-1投与量	下記投与量を1日2回		
体表面積	1.25㎡未満	1.25㎡以上1.5㎡未満	1.5㎡以上
1回投与量	40mg	50mg	60mg

Day8

生食 100mL
(ルート確保用)
→ ソルデム3A 500mL
→(1時間 500mL/h) ソルデム3A 500mL
→(1時間 500mL/h) ソルデム3A 500mL
→(1時間 500mL/h) アロキシ注 0.75mg
デキサート注 9.9mg
→(15分 200mL/h)

生食 300mL
シスプラチン注 60mg/㎡
→(2時間) 20%マンニットール注 300mL
→(2時間 150mL/h) ソルデム3A 500mL
→(1時間 500mL/h) ソルデム3A 500mL
→(1時間 500mL/h) ソルデム3A 500mL
→(1時間 500mL/h)

ソルデム3A 500mL
→(1時間 500mL/h) アセトキープ3G 500mL
→(5時間 100mL/h) 終了

福岡大学筑紫病院