★ XP＋HER初回(D1)21d:16070015

2018年5月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	XP＋HER初回(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ注 初回	8mg/kg	●																				
シスプラチン注	80mg/㎡	●																				
ゼローダ錠	C法(下記参照)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day2、3)
デカドロン錠(4)　2錠　1日2回　朝昼(day2、3、4、必要時day5)

※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する際は改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL
※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

ゼローダ投与量	下記投与量を1日2回　朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)
→
ソルデム3A　500mL
→ 2時間 250mL/h
ソルデム3A　500mL
→ 2時間 250mL/h
アロキシ点滴0.75mg
デキサート注 9.9mg
→ 15分 200mL/h
生食 250mL
トラスツズマブ注
8mg/kg
→ 90分※ 167mL/h

※2回目以降、30分に変更可能

生食 300mL
シスプラチン注
80mg/㎡
→ 2時間
20%マンニットール注
300mL
→ 90分 200mL/h
ソルデム3A　500mL
→ 2時間 250mL/h
ソルデム3A　500mL
→ 2時間 250mL/h
終了

福岡大学筑紫病院