★ SP＋HER2回目以降(D1)21d療法：16070020　　2018年5月(第1版)

| | |
|---|---|
| **診療科・対象疾患** | 外科・胃癌 |
| **プロトコール名** | SP＋HER2回目以降(D1)21d |
| **1コース日数** | 21日 |
| 催吐リスク分類 | 高度 |

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラスツズマブ注 | 6mg/kg | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 | 60mg/㎡ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1 | 下記参照 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**治療スケジュール**

処方

イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day2、3)
デカドロン錠(4)　2錠　1日2回　朝昼(day2、3、4、必要時day5)

※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する際は改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL
※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

| S-1投与量 | 下記投与量を1日2回 | | |
|---|---|---|---|
| 体表面積 | 1.25㎡未満 | 1.25㎡以上1.5㎡未満 | 1.5㎡以上 |
| 1回投与量 | 40mg | 50mg | 60mg |

**Day 1**

生食 100mL
(ルート確保用)
→
ソルデム3A 500mL
2時間 250mL/h →
ソルデム3A 500mL
2時間 250mL/h →
アロキシ点滴 0.75mg
デキサート注 9.9mg
15分 200mL/h →
生食 250mL
トラスツズマブ注 6mg/kg
30分※ 500mL/h →

※2回目以降、30分に変更可能

生食 300mL
シスプラチン注 60mg/㎡
2時間 →
20%マンニットール注 300mL
90分 200mL/h →
ソルデム3A 500mL
2時間 250mL/h →
ソルデム3A 500mL
2時間 250mL/h →
終了

福岡大学筑紫病院