診療科・対象疾患	その他・多発血管性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎
プロトコール名	リツキシマブ療法
1コース日数	7日
催吐リスク分類	最小度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7
リツキシマブBS注	375mg/㎡	●						

治療スケジュール

処方

カロナール錠(500)　1錠　1日1回　投与開始30分前
デザレックス錠(5)　1錠　1日1回　投与開始30分前

※ 4コース予定
※ 投与量は最大500mg/回

Day1

生食 500mL
(ルート確保用)
→
生食
リツキシマブBS注
375mg/㎡
(最大500mg/回)
※10倍希釈
→ ※投与速度は下記参照 → 終了

※初回の投与速度

50ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 100ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 150ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 200ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 250ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 300ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 350ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 400ml/hへup可能

※2回目以降の投与速度(1コース目の有害事象がGrade2以下の場合)

100ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 200ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 300ml/hで30分 → 患者の状態に変化なければ → 400ml/hへup可能