

|          |               |
|----------|---------------|
| 診療科・対象疾患 | 呼吸器内科・肺癌      |
| プロトコール名  | CDDP+PEM(4週毎) |
| 1コース日数   | 28日           |
| 催吐リスク分類  | 高度            |

| 薬剤名      | 投与量                  | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------|----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ペムトレキセド注 | 500mg/m <sup>2</sup> | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| シスプラチン注  | 75mg/m <sup>2</sup>  | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

治療スケジュール

処方

パンピタン末 1g 1日1回 朝食後  
 初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで可能な限り継続投与  
 メチコバル注500μg 2A 筋注  
 初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与  
 デカドロン錠(4) 2錠 1日2回 朝昼(day2、3、4、必要時day5)  
 (必要時)オランザピン錠(2.5) 2錠 1日1回 夕(day1、2、3、4)

- ※ 治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること
- ※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
- ※ 当日は測尿を行う

Day 1

