診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	CBDCA+PEM+Bev(3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ベバシズマブ注	15mg/kg	●																											
ペメトレキセド注	500mg/㎡	●																											
カルボプラチン注	AUC5～6	●																											

治療スケジュール

処方

パンビタン末　1g　1日1回　朝食後
　初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
メチコバール注500μg　2A　筋注
　初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与
（必要時）デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝（day2、3、4）

Day1

生食 500mL
（ルート確保用）
→
生食 100mL
ベバシズマブ注
15mg/kg
→ 90分※
パロノセトロン点滴
0.75mg
デキサート注4.95mg
アロカリス点滴静注
235mg
→ 30分
生食 50mL
→ 15分
生食 100mL
ペメトレキセド注
500mg/㎡
→ 10分

※2コース目60分、3コース目以降30分
と段階的に変更可能

生食 50mL
→ 15分
5%糖液 250mL
カルボプラチン注
AUC5～6
→ 1時間
終了