診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	CBDCA+PTX+Bev+Atezolizumab(3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
テセントリク注	1200mg/body	●																											
ベバシズマブ注	15mg/kg	●																											
パクリタキセル注	200mg/㎡	●																											
カルボプラチン注	AUC6	●																											

治療スケジュール

処方

※ 投与の際はドリップアイを使用

レスタミン錠 (10)　　5錠　1日1回　朝(day1)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3、4)

Day1

生食 500mL
(ルート確保用)
フィルター付ルート使用

→ 生食 250mL
テセントリク注
1200mg/body
※2コース目以降30分に変更可能

1時間※ → 生食 50mL

15分 → 生食 100mL
ベバシズマブ注
15mg/kg
※2コース目60分、3コース目以降30分と段階的に変更可能

90分※ → 生食 50mL

15分 →

レスタミン (10) 5錠
パロノセトロン点滴
0.75mg
デキサート注16.5mg
ファモチジン注20mg
アロカリス点滴静注
235mg

30分 → 生食 50mL

15分 → 生食 500mL
パクリタキセル注
200mg/㎡

3時間 → 5%糖液 250mL
カルボプラチン注
AUC6

1時間 → 終了

福岡大学筑紫病院