診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab(3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
キイトルーダ注	200mg/body	●																											
アブラキサン注	100mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン注	AUC6	●																											

治療スケジュール

処方

※ 投与の際はドリップアイを使用

（必要時）デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝（day2、3、4）

Day1

生食 500mL（ルート確保用） → 生食 100mL キイトルーダ注 200mg/body → 30分 → 生食 50mL → 15分 → パロノセトロン点滴 0.75mg デキサート注4.95mg アロカリス点滴静注 235mg → 30分 → 生食 50mL → 15分 →

フィルター付ルート使用（アブラキサンはフィルター不可）

生食※ アブラキサン注 100mg/㎡ → 30分 → 生食 50mL → 15分 → 5%糖液 250mL カルボプラチン注 AUC6 → 1時間 → 終了

※5mg/mLに希釈

Day8、15

生食 500mL（ルート確保用） → 生食 100mL デキサート注 6.6mg → 30分 → 生食 50mL → 15分 → 生食※ アブラキサン注 100mg/㎡ → 30分 → 終了

※5mg/mLに希釈