

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 診療科・対象疾患 | 呼吸器内科・肺癌                    |
| プロトコール名  | CBDCA+PEM+Atezolizumab(3週毎) |
| 1コース日数   | 21日                         |
| 催吐リスク分類  | 中等度                         |

| 薬剤名      | 投与量                  | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| テセントリク注  | 1200mg/body          | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ペメトレキセド注 | 500mg/m <sup>2</sup> | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カルボプラチン注 | AUC6                 | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

治療スケジュール

処方

パンビタン末 1g 1日1回 朝食後  
 初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬  
 メチコバルル注500μg 2A 筋注  
 初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与  
 (必要時) デカドロン錠(4) 1錠 1日1回 朝(day2、3、4)

Day1

