

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 診療科・対象疾患 | 呼吸器内科・肺癌                     |
| プロトコール名  | PEM+Atezolizumab メンテナンス(3週毎) |
| 1コース日数   | 21日                          |
| 催吐リスク分類  | 軽度                           |

| 薬剤名     | 投与量                  | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| テセントリク注 | 1200mg/body          | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ペトレキセド注 | 500mg/m <sup>2</sup> | ●    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

治療スケジュール  
処方

パンビタン末 1g 1日1回 朝食後  
初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬  
メチコバル注500μg 2A 筋注  
初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与

※ CDDP+PEM+Atezolizumab療法またはCBDCA+PEM+Atezolizumab療法  
4~6コース後の維持療法

Day 1

