

| | |
|----------|---------------------------|
| 診療科・対象疾患 | 呼吸器内科・肺癌 |
| プロトコール名 | CDDP+GEM+Necitumumab(3週毎) |
| 1コース日数 | 21日 |
| 催吐リスク分類 | 高度 |

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ポートラーザ注 | 800mg/body | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゲムシタビン注 | 1250mg/m ² | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 | 75mg/m ² | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

治療スケジュール

処方

デカドロン錠(4) 2錠 1日2回 朝昼(day2、3、4、必要時day5)
 (必要時)オランザピン錠(2.5) 2錠 1日1回 夕(day1、2、3、4)


- ※ 治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること
- ※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
- ※ 当日は測尿を行う

| | |
|----------|----------------------|
| 診療科・対象疾患 | 呼吸器内科・肺癌 |
| プロトコール名 | ポートラーザ+GEM+CDDP(3週毎) |
| 1コース日数 | 21日 |
| 催吐リスク分類 | 高度 |

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ポートラーザ注 | 800mg/body | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゲムシタビン注 | 1250mg/m ² | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 | 75mg/m ² | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

治療スケジュール

Day 1



Day 8

