

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	PEM+Durvalumab+Tremelimumab(8週毎)
1コース日数	56日
催吐リスク分類	軽度

薬剤名	投与量	day1	2	3				27	28	29	30	31				54	55	56
イミフィンジ注	1500mg/body	●									●									
イジユド注	75mg/body										●									
ペメトレキセド注	500mg/m ²	●									●									

治療スケジュール

処方

パンビタン末 1g 1日1回 朝食後
 初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
 メチコバル注500 μ g 2A 筋注
 初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与


※ イミフィンジ: 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg
 ※ スケジュール
 CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab(3週毎)4コース
 →**PEM+Durvalumab+Tremelimumab(8週毎)**
 →PEM+Durvalumab maintenance(4週毎)

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	PEM+Durvalumab+Tremelimumab(8週毎)
1コース日数	56日
催吐リスク分類	軽度

薬剤名	投与量	day1	2	3	27	28	29	30	31	54	55	56
イミフィンジ注	1500mg/body	●						●						
イジユド注	75mg/body							●						
ペムトレキセド注	500mg/m ²	●						●						

治療スケジュール

Day1



Day29

