診療科・対象疾患 呼吸器内科・肺癌 プロトコール名 CBDCA+VP-16+Atezolizumab(3週毎) 1コース日数 21日 催吐リスク分類 中等度

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
|----------|-------------------|------|---|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| テセントリク注 | 1200mg/body | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 | AUC5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エトポシド注 | 100mg/ m ² | | • | lacksquare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

治療スケジュール

処方

(必要時) デカドロン錠(4) 1錠 1日1回 朝(day4)

※ エトポシドは溶解後結晶が析出するため、濃度 0.4mg/mL以下とし、DEHPフリー点滴セット (フィルターなし)を使用

