診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	CBDCA+VP-16+Durvalumab(3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
イミフィンジ注	1500mg/body	●																											
カルボプラチン注	AUC5	●																											
エトポシド注	100mg/㎡	●	●	●																									

治療スケジュール

処方

（必要時）デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝（day4）

※ イミフィンジ：体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg
※ 4コース終了後は、イミフィンジ単剤治療
※ エトポシドは溶解後結晶が析出するため、濃度 0.4mg/mL以下とし、DEHPフリー点滴セット（フィルターなし）を使用

Day1

生食 500mL（ルート確保用） → 生食 100mL イミフィンジ注 1500mg/body → 1時間 → 生食 50mL → 15分 → パロノセトロン点滴 0.75mg デキサート注4.95mg アロカリス点滴静注 235mg → 30分 → 生食 50mL → 15分 →

フィルター付ルート使用（エトポシドはフィルター不可）

※希釈溶液最終濃度：1～15mg/mL
※調製後12時間以内に投与終了

5%糖液 250mL カルボプラチン注 AUC5 → 1時間 → 5%糖液 500mL エトポシド注 100mg/㎡ → 90分 → 終了

Day2、3

生食 500mL（ルート確保用） → 生食 100mL デキサート注 3.3mg → 30分 → 5%糖液 500mL エトポシド注 100mg/㎡ → 90分 → 終了