診療科・対象疾患	外科・大腸癌
プロトコール名	XELOX＋P-mab(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ベクティビックス注	6mg/kg	●																											
オキサリプラチン注	130mg/㎡	●																											
カペシタビン錠	C法（下記参照）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

治療スケジュール

処方

レスタミン錠（10）　5錠　1日1回　朝（day1）
（必要時）デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝（day2、3、4）

※ 投与の際はドリップアイを使用

カペシタビン投与量	下記投与量を1日2回　朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

※ カペシタビンは治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

Day1

5%糖液 100mL
（ルート確保用）
フィルター付ルート使用

→ パロノセトロン点滴 0.75mg
デキサート注4.95mg
アロカリス点滴静注 235mg

30分 → 生食 50mL

15分 → 生食 100mL
ベクティビックス注 6mg/kg

60分 → 生食 50mL

15分 →

5%糖液 250mL
オキサリプラチン注 130mg/㎡
デキサート注 3.3mg

2時間 → 終了

5%糖液 500mL
250mL/h