診療科・対象疾患呼吸器内科・肺癌プロトコール名CDDP+GEM+Necitumumab(3週毎)1コース日数21日催吐リスク分類高度

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
|---------|--------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--------|
| ポートラーザ注 | 800mg/body | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \Box |
| ゲムシタビン注 | 1250mg∕ m ੰ | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 | 75mg∕ m i̇́ | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

治療スケジュール

処方

デカドロン錠(4) 2錠 1日2回 朝昼(day2、3、4、必要時day5) (必要時)オランザピン錠(2.5) 2錠 1日1回 夕(day1、2、3、4)

- ※ 治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること
- ※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
- ※ 当日は測尿を行う

診療科·対象疾患 呼吸器内科·肺癌 プロトコール名 ポートラーザ+GEM+CDDP(3週毎) 1コース日数 21日 催吐リスク分類高度

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
|---------|--------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| ポートラーザ注 | 800mg/body | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゲムシタビン注 | 1250mg/ m ² | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 | 75mg/ m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

生食 50mL

1時間




生食 500mL

(ルート確保用)

生食 250mL

ポートラーザ注



生食 100mL

デキサート注 6.6mg

15分

30分

5%糖液 100mL

ゲムシタビン注

1250mg/m²

30分