診療科・対象疾患 呼吸器内科·肺癌

プロトコール名 CBDCA+PEM+Amivantamab(3週毎)1コース目(体重80kg未満)

1コース日数 21日

催吐リスク分類 中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
ペメトレキセド注	500mg/ m i̇́																									\Box
カルボプラチン注	AUC5																									
ライブリバント注	350mg/body																									
ライブリバント注	1050mg/body																									
ライブリバント注	1400mg/body								•							•										
																										\Box

治療スケジュール

処方

パンビタン末 1g 1日1回 朝食後

初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬

メチコバール注500μg 2A 筋注


初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与

デザレックス錠(5) 1錠 1日1回 朝(day1、2、8、15)

カロナール錠(500) 2錠 1日1回 朝(day1、2、8、15)

(必要時) デカドロン錠(4) 1錠 1日1回 朝(day3)

※ day1はカルボプラチン投与終了時に 薬剤部へライブリバント調製依頼の連絡をすること




診療科·対象疾患 呼吸器内科·肺癌

プロトコール名 CBDCA+PEM+Amivantamab(3週毎)1コース目(体重80kg未満)

1コース日数 21日

催吐リスク分類 中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				\Box
ペメトレキセド注	500mg/ m i̇́																									
カルボプラチン注	AUC5																									
ライブリバント注	350mg/body																									
ライブリバント注	1050mg/body																									
ライブリバント注	1400mg/body								lacksquare							•										
																										\neg



福岡大学筑紫病院