診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	CBDCA+PEM+Amivantamab(3週毎)2コース目(体重80kg未満)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ペメトレキセド注	500mg/㎡	●																											
カルボプラチン注	AUC5	●																											
ライブリバント注	1400mg/body	●																											

治療スケジュール

処方

パンビタン末　1g　1日1回　朝食後
　初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
メチコバール注500μg　2A　筋注
　初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与
デザレックス錠(5)　1錠　1日1回　朝(day1)
カロナール錠(500)　2錠　1日1回　朝(day1)
(必要時)デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)

Day1

生食 500mL
(ルート確保用)
フィルター付ルート使用

→ パロノセトロン点滴 0.75mg
デキサート注4.95mg
アロカリス点滴静注 235mg
カロナール、
デザレックス内服

→ 30分 → 生食 50mL

→ 15分 → 生食 100mL
ペメトレキセド注 500mg/㎡

→ 10分 → 生食 50mL

→ 15分 →

5%糖液 250mL
カルボプラチン注 AUC5

→ 1時間 → 生食 50mL

→ 15分 → 生食 222mL　※
ライブリバント注 1400mg/body
(全量250mL)

→ 125mL/h 2時間 → 終了

※調製後10時間以内に投与終了