| | |
|---|---|
| **診療科・対象疾患** | 呼吸器内科・肺癌 |
| **プロトコール名** | CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab(3週毎) |
| **1コース日数** | 21日 |
| 催吐リスク分類 | 中等度 |

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イミフィンジ注 | 1500mg/body | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イジュド注 | 75mg/body | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 | 500mg/㎡ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 | AUC5 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**治療スケジュール**

処方

パンビタン末　1g　1日1回　朝食後
　初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
メチコバール注500μg　2A　筋注
　初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3、4)

※ イミフィンジ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg
※ スケジュール
**CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab(3週毎)** 4コース
→Durvalumab+Tremelimumab(8週毎)
→Durvalumab maintenance(4週毎)

**Day1**

生食 500mL (ルート確保用) → 生食 100mL イジュド注 75mg/body → 1時間 → 生食 50mL → 15分 → 生食 100mL イミフィンジ注 1500mg/body → 1時間 → 生食 50mL → 15分 →

***フィルター付ルート使用***

パロノセトロン点滴 0.75mg
デキサート注4.95mg
アロカリス点滴静注 235mg
→ 30分 → 生食 50mL → 15分 → 生食 100mL ペメトレキセド注 500mg/㎡ → 10分 → 5%糖液 250mL カルボプラチン注 AUC5 → 1時間 → 終了

福岡大学筑紫病院