

診療科・対象疾患	呼吸器内科・非小細胞肺がん(ICIあり)
プロトコル名	ネオアジュバント CDDP+GEM+Pembrolizumab(3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

[illegible]


治療スケジュール

処方

デカドロン錠(4) 2錠 1日2回 朝昼(day2、3、4、必要時day5)

- ※ 治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること
- ※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
- ※ 当日は測尿を行う
- ※ 最大4コースまで
- ※ 扁平上皮癌

Day 1



診療科・対象疾患	呼吸器内科・非小細胞肺癌 (ICIあり)
プロトコール名	ネオアジュバント CDDP+GEM+Pembrolizumab (3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
キイトルーダ注	200mg/body	●																												
ゲムシタビン注	1000mg/m ²	●							●																					
シスプラチン注	75mg/m ²	●																												

治療スケジュール
処方

デカドロン錠(4) 2錠 1日2回 朝昼 (day2、3、4、必要時day5)

- ※ 治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること
- ※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
- ※ 当日は測尿を行う
- ※ 最大4コースまで
- ※ 扁平上皮癌

Day 8

