

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	ネオアジュバントCDDP+GEM+Durvalumab (3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
イミフィンジ注	1500mg/body	●																											
シスプラチン注	75mg/m ²	●																											
ゲムシタビン注	1000mg/m ²	●							●																				

治療スケジュール
処方


デカドロン錠(4) 2錠 1日2回 朝昼(day2、3、4)
(必要時)オランザピン錠(2.5) 2錠 1日1回 夕(day1、2、3、4)

- ※ 治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること
- ※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
- ※ 当日は測尿を行う
- ※ イミフィンジ: 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg
- ※ 4コース
- ※ 扁平上皮癌

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	ネオアジュバントCDDP+GEM+Durvalumab (3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

[illegible]

Day 1



```

graph LR
    A["生食 500mL  
(ルート確保用)"] --> B["生食 100mL  
デキサート注 6.6mg"]
    B -- "30分" --> C["5%糖液 100mL  
ゲムシタビン注  
1000mg/m²"]
    C -- "30分" --> D["終了"]
  
```