

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	ネオアジュバントCDDP+PEM+Durvalumab (3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

[illegible]

パンビタン末 1g 1日1回 朝食後
初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
メチコバルル注500 μ g 2A 筋注
初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与
デカドロン錠(4) 2錠 1日2回 朝昼 (day2、3、4)
(必要時)オランザピン錠(2.5) 2錠 1日1回 夕(day1、2、3、4)

- ※ 治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本
飲水すること
- ※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
- ※ 当日は測尿を行う
- ※ イミフィンジ: 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg
- ※ 4コース
- ※ 非扁平上皮癌

```

graph LR
    subgraph "フィルター付ルート使用"
        A["生食 500mL  
(ルート確保用)"] --> B["生食 100mL  
イミフィンジ注  
1500mg/body"]
        B -- "1時間" --> C["生食 50mL"]
        C -- "15分" --> D["生食 500mL  
KCL10mEq  
硫酸Mg補正液4mEq"]
        D -- "1時間" --> E["生食 50mL"]
        E -- "15分" --> F[""]
    end

    G["パロノセトロン点滴  
0.75mg  
デキサート注 9.9mg  
アロカリス点滴静注  
235mg"] -- "30分" --> H["生食 50mL"]
    H -- "15分" --> I["生食 100mL  
ペメトレキセド注  
500mg/m²"]
    I -- "10分" --> J["生食 50mL"]
    J -- "15分" --> K["20%マンニトール注  
300mL"]
    K -- "45分" --> L[""]

    M["生食 300mL  
シスプラチン注  
75mg/m²"] -- "2時間" --> N["生食 500mL  
KCL10mEq  
硫酸Mg補正液4mEq"]
    N -- "1時間" --> O["終了"]
  
```

生食 500mL (ルート確保用) → 生食 100mL イミフィンジ注 1500mg/body (1時間) → 生食 50mL (15分) → 生食 500mL KCL10mEq 硫酸Mg補正液4mEq (1時間) → 生食 50mL (15分)

フィルター付ルート使用

パロノセトロン点滴 0.75mg
デキサート注 9.9mg
アロカリス点滴静注 235mg (30分) → 生食 50mL (15分) → 生食 100mL ペメトレキセド注 500mg/m² (10分) → 生食 50mL (15分) → 20%マンニトール注 300mL (45分)

生食 300mL シスプラチン注 75mg/m² (2時間) → 生食 500mL KCL10mEq 硫酸Mg補正液4mEq (1時間) → 終了

福岡大学筑紫病院
