診療科・対象疾患	腎泌尿器外科・尿路上皮癌
プロトコール名	Dose-dense M-VAC療法
1コース日数	14日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メソトレキセート注	30mg/㎡	●													
エクザール注	3mg/㎡		●												
ドキソルビシン注	30mg/㎡		●												
シスプラチン注	70mg/㎡		●												

治療スケジュール

デカドロン錠(4)　2錠　1日2回　朝昼(day3、4、5)
(必要時)オランザピン錠(2.5)　2錠　1日1回　夕(day2、3、4、5)

※ Day4にジーラスタ3.6mgを投与(抗がん薬投与終了後24時間以降)
※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
※ 当日は測尿を行う

Day1

生食 500mL (ルート確保用) → 生食 50mL メソトレキセート注 30mg/㎡ → 5分 → 生食 500mL → 3時間 → 終了

Day2

生食 500mL (ルート確保用) → 生食 500mL → 2時間 → パロノセトロン点滴 0.75mg デキサート注 9.9mg アロカリス注 235mg → 30分 → 生食 50mL → 15分 → 生食 50mL ドキソルビシン注 30mg/㎡ → 5分 →

生食 50mL エクザール注 3mg/㎡ → 5分 → ソルデム3A 500mL 硫酸Mg 4mEq → 90分 → マンニットール注 300mL → 30分 → 生食 350mL シスプラチン注 70mg/㎡ → 3時間 → ソルデム3A 500mL 硫酸Mg 4mEq → 90分 →

生食 500mL → 5時間 → 終了