診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	XELOX(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
オキサリプラチン注	130mg/㎡	●																											
カペシタビン錠	C法(下記参照)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

治療スケジュール

処方

レスタミン錠(10)　5錠　1日1回　朝(day1)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3、4)

※ 投与の際はドリップアイを使用

カペシタビン投与量	下記投与量を1日2回　朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

※ カペシタビンは治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

Day1

5%糖液 100mL
(ルート確保用)

→

パロノセトロン点滴 0.75mg
デキサート注4.95mg
アロカリス点滴静注 235mg

→ 30分 →

生食 50mL

→ 15分 →

5%糖液 250mL
デキサート注 3.3mg
オキサリプラチン注 130mg/㎡

5%糖液 500mL 250mL/h

→ 2時間 → 終了