診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	SOX＋HER初回(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ注 初回	8mg/kg	●																				
オキサリプラチン注	130mg/㎡	●																				
S-1	下記参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

治療スケジュール

処方

レスタミン錠(10)　　5錠　1日1回　朝(day1))
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3、4)

※ 投与の際はドリップアイを使用

※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する際は改めて初回投与量で行う

※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL

S-1投与量	下記投与量を1日2回		
体表面積	1.25㎡未満	1.25㎡以上1.5㎡未満	1.5㎡以上
1回投与量	40mg	50mg	60mg

※ S-1は治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

Day1

5%糖液 100mL
(ルート確保用)
→
パロノセトロン点滴
0.75mg
デキサート注4.95mg
アロカリス点滴静注
235mg
30分
→
生食 50mL
15分
→
5%糖液 250mL
デキサート注 3.3mg
オキサリプラチン注
130mg/㎡
2時間
→
生食 50mL
15分
→

5%糖液 500mL
250mL/h

生食 250mL
トラスツズマブ注
8mg/kg
90分※
→
終了

※2回目以降、30分に変更可能