

診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	Zolbetuximab+CAPOX(D1)21d (初回)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

[illegible]

治療スケジュール
処方


デザレックス錠(5) 1錠 1日1回 朝(day1)
デカドロン錠(4) 2錠 1日1回 朝(day2、3)
(必要時)ジプレキサ錠(2.5) 2錠 1日1回 タ(day0、1、2、3、4)

- ※ オキサリプラチン併用は8コースまで
- ※ 初回は入院で施行
- ※ 投与の際はドリップアイを使用

カペシタビン投与量	下記投与量を1日2回 朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

※ カペシタビンは治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

Day 1



診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	Zolbetuximab+CAPOX(D1)21d (初回)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

[illegible]

治療スケジュール
処方

- ※ オキサリプラチン併用は8コースまで
- ※ 初回は入院で施行
- ※ 投与の際はドリップアイを使用

※ 投与の際はドリップアイを使用

カペシタビン投与量	下記投与量を1日2回 朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

※ カペシタビンは治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

デザレックス錠(5) 1錠 1日1回 朝(day1)
デカドロン錠(4) 2錠 1日1回 朝(day2、3)
(必要時)ジプレキサ錠(2.5) 2錠 1日1回 タ(day0、1、2、3、4)

※ ビロイの投与速度(初回)は下記参照

ビロイ投与量(mg)	点滴投与液量(mL) [濃度2.0mg/mL]	投与速度(mL/時)	
		投与開始から30～60分後まで	その後
800	400	50	100-200
880	440	55	110-220
960	480	60	120-240
1040	520	65	130-260
1120	560	70	140-280
1200	600	75	150-300
1280	640	80	160-320
1360	680	85	170-340
1440	720	90	180-360
1520	760	95	190-380
1600	800	100	200-400