

診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	Zolbetuximab+CAPOX(D1)21d(2回目以降)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

[illegible]

治療スケジュール
処方


デザレックス錠(5) 1錠 1日1回 朝(day1)
デカドロン錠(4) 2錠 1日1回 朝(day2、3)
(必要時)ジプレキサ錠(2.5) 2錠 1日1回 タ(day0、1、2、3、4)

- ※ オキサリプラチン併用は8コースまで
- ※ 初回は入院で施行
- ※ 投与の際はドリップアイを使用

カペシタビン投与量	下記投与量を1日2回 朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

※ カペシタビンは治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

Day 1



診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	Zolbetuximab+CAPOX(D1)21d(2回目以降)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
ビロイ注	600mg/m ²	●																												
オキサリプラチン注	130mg/m ²	●																												
カペシタビン錠	C法(下記参照)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															

治療スケジュール
処方

- ※ オキサリプラチン併用は8コースまで
- ※ 初回は入院で施行
- ※ 投与の際はドリップアイを使用

カペシタビン投与量	下記投与量を1日2回 朝・夕食後			
体表面積	1.36m ² 未満	1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1.96m ² 以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

※ カペシタビンは治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

※ ビロイの投与速度(2回目以降)は下記参照

ビロイ投与量(mg)	点滴投与液量(mL) [濃度2.0mg/mL]	投与速度(mL/時)	
		投与開始から30～60分後まで	その後
600	300	38	75-150
660	330	41	83-165
720	360	45	90-180
780	390	49	98-195
840	420	53	105-210
900	450	56	113-225
960	480	60	120-240
1020	510	64	128-255
1080	540	68	135-270
1140	570	71	143-285
1200	600	75	150-300