診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	Zolbetuximab+Capecitabine療法(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ビロイ注	600mg/㎡	●																											
カペシタビン錠	C法（下記参照）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

治療スケジュール

処方

デザレックス錠（5）1錠　1日1回　朝（day1）
デカドロン錠(4)　2錠　1日1回　朝（day2、3）
（必要時）ジプレキサ錠(2.5)　2錠　1日1回　夕（day0、1、2、3、4）

カペシタビン投与量	下記投与量を1日2回　朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

※　カペシタビンは治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

Day1

生食 500mL（ルート確保用）
→
デキサート注9.9mg（側管静注）
→
※ パロノセトロン点滴 0.75mg / アロカリス点滴静注 235mg
→ 30分 →
生食 50mL
→ 15分 →
生食 500mL / ビロイ注 600mg/㎡
→ 2時間以上※ → 終了

フィルター付ルート使用

※投与開始時に看護師より薬剤部へビロイ調製依頼の連絡を行う　※2mg/mLになるように調製
※投与速度は左記参照
※調製後6時間以内に投与終了

ビロイ投与量（mg）	点滴投与液量（mL）［濃度2.0mg/mL］	投与速度（mL/時）	
		投与開始から30～60分後まで	その後
600	300	38	75-150
660	330	41	83-165
720	360	45	90-180
780	390	49	98-195
840	420	53	105-210
900	450	56	113-225
960	480	60	120-240
1020	510	64	128-255
1080	540	68	135-270
1140	570	71	143-285
1200	600	75	150-300