診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	G-SOX(L-OHP:130mg/㎡)(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
オキサリプラチン注	130mg/㎡	●																											
S-1	下記参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

治療スケジュール

処方

レスタミン錠 (10)　　5錠　1日1回　朝(day1)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)

※ 投与の際はドリップアイを使用

S-1投与量	下記投与量を1日2回		
体表面積	1.25㎡未満	1.25㎡以上1.5㎡未満	1.5㎡以上
1回投与量	40mg	50mg	60mg

※ S-1は治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

Day1

生食 500mL
(ルート確保用)
→
パロノセトロン点滴
0.75mg
デキサート注4.95mg
アロカリス点滴静注
235mg
30分
→
生食 50mL
15分
→
5%糖液 250mL
デキサート注 3.3mg
オキサリプラチン注
130mg/㎡
2時間
→
終了

5%糖液 500mL
250mL/h