

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 診療科・対象疾患 | 外科・胃癌 |
| プロトコール名 | Pembrolizumab+Trastuzumab+FP(2回目以降) |
| 1コース日数 | 21日 |
| 催吐リスク分類 | 高度 |

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----------|----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| キイトルーダ注 | 200mg/body | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トラスツズマブ注 | 6mg/kg | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 | 80mg/m ² | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注 | 800mg/m ² | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |


治療スケジュール

処方

(必要時)オランザピン錠(2.5) 2錠 1日1回 タ(day1、2、3、4)

- ※ 治療前日から翌々日まで、輸液負荷を行うこと
- ※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
- ※ 当日は測尿を行う
- ※ シスプラチンは最大6コースまで
- ※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する場合は改めて初回投与量で行う
- ※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL

Day1



Day2-5

