

診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	Pembrolizumab+Trastuzumab+SOX (初回)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																	
キイトルーダ注	200mg/body	●																																					
トラスツズマブ注	8mg/kg	●																																					
オキサリプラチン注	130mg/m ²	●																																					
S-1	下記参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																								

治療スケジュール
処方

(必要時) デカドロン錠(4) 1錠 1日1回 朝(day2、3、4)

- ※ 投与の際はドリップアイを使用
- ※ オキサリプラチンは最大6又は8コースまで
- ※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間以上後に投与する場合は改めて初回投与量で行う
- ※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL

S-1投与量	下記投与量を1日2回		
体表面積	1.25m ² 未満	1.25m ² 以上1.5m ² 未満	1.5m ² 以上
1回投与量	40mg	50mg	60mg

※ S-1は治療当日夕より開始し、15日目朝まで内服

